

【用法・用量】の追加のお知らせ

E P A製剤

イコサペント酸エチル・軟カプセル剤

ナサチームカプセル 300

製造販売元

東菱薬品工業株式会社

東京都千代田区有楽町 1-10-1

販売元

株式会社イセイ

山形県山形市若葉町 13 番 45 号

謹啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は弊社製品にひとかたならぬ御愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社E P A製剤「ナサチームカプセル 300」につきまして、下記の通り「用法・用量」が追加になりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜ります様、お願い申し上げます。

謹白

平成25年5月

記

ナサチームカプセル 300 (E P A製剤)

改訂後(下線部分：変更箇所)	改訂前
【効能・効果】、【用法・用量】	【効能・効果】、【用法・用量】
<ul style="list-style-type: none">閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛および冷感の改善 (変更なし)高脂血症 イコサペント酸エチルとして、通常、成人1回 900 m g (3 カプセル)を1日2回又は1回600m g (2 カプセル)を1日3回、食直後に経口投与する。 ただし、トリグリセリドの異常を呈する場合には、その程度により、1回 900m g (3 カプセル)、1日3回まで増量できる。	<ul style="list-style-type: none">閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛および冷感の改善 (略)高脂血症 イコサペント酸エチルとして、通常、成人1回 600 m g (2 カプセル)を1日3回、毎食直後に経口投与する。 ただし、トリグリセリドの異常を呈する場合には、その程度により、1回 900m g (3 カプセル)、1日3回まで増量できる。